

FICHA TÉCNICA

Consulte a su médico veterinario

Porque es parte de tu FAMILIA



FREE professional

Ingrediente activo fipronil

Insecticida de uso pecuario / Solución concentrada para aplicación cutánea

RSCO – INAC – 0101A – 0639 – 088 - 10

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo:	P/P
Fipronil: 5-amino-1-(2,6-dicloro-a,a,a-trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3 carbonitrilo (Equivalente a 107.5 g de i.a. / L a 25°C)	10%
Ingredientes inertes:	
Disolvente y estabilizante	90%
Total	100%



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

PRECAUCIÓN

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.

“No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.

“Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.

“Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.

“No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.

“No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

INSTRUCCIONES DE USO

“ESTE PRODUCTO NO DEBERÁ SER UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE INFESTACIONES POR GARRAPATAS EN BOVINOS”.

Pet ´n Play FREE es un producto para las mascotas de fácil aplicación y acción rápida a base de fipronil, para tratar y controlar las infestaciones causadas por pulgas, garrapatas y piojos.

Controla reinfestaciones por pulgas (*Ctenocephalides spp.*) solas o asociadas a garrapatas y/o piojos picadores. Previene la multiplicación de pulgas por inhibición del desarrollo de huevos (actividad ovicida) y de larvas y pupas (actividad larvicida) hasta por 3 meses.

Combate reinfestaciones provocadas por todas las etapas de desarrollo de las garrapatas del género *Rhipicephalus*, *Dermacentor*, *Haemaphysalis* e *Ixodes* (principal vector de la enfermedad de Lyme en humanos y perros); hasta por 4 semanas.

Eliminación de piojos picadores (*Trichodectes canis*).

El producto puede utilizarse como parte de la estrategia de tratamiento para el control de la Dermatitis Alérgica por Pulgas (DAP).

Pet 'n Play FREE es fácil, rápido y seguro, sólo aplícalo sobre el lomo de tu mascota, su fórmula empieza a actuar de inmediato y puede ser usado en cachorros de 8 semanas y 1 kilo de peso, gatos a partir de 12 semanas y hembras en lactancia. Es ideal para animales sensibles.

DOSIS:

ÚNICA, NO SE RECOMIENDA FRACCIONAR LA APLICACIÓN.

La dosis recomendada para la mascota es:

PESOS	DOSIS
Menos de 2 kg	0.5 ml
2 – 10 kg	0.67 ml
11 – 20 kg	1.34 ml
21 – 40 kg	2.68 ml
40 kg o más	4.02 ml



INSTRUCCIONES DE USO:



1. Retira la pipeta del empaque y mantenla en posición vertical.



2. Desprenda la punta de la pipeta.



3. Coloca y aplica la punta de la pipeta en la cruz y el lomo de tu mascota.

INTERVALOS DE APLICACIÓN:

En casos de alta infestación, cuando se presenta Dermatitis Alérgica por Pulgas (DAP), o que se requiera controlar la garrapata, se recomiendan aplicaciones mensuales. En infestaciones menos severas se recomiendan intervalos de uno a tres meses según la gravedad de la infestación.

CONTRAINDICACIONES:

No bañar a la mascota 48 horas antes o después de la aplicación de **Pet 'n Play FREE**. No se recomienda utilizar el producto en cachorros antes de 8 semanas de edad. Los animales tratados no deben ser tocados, ni se debe autorizar a los niños a jugar con éstos hasta que el punto de aplicación esté seco.

VÍA DE APLICACIÓN: Aplicación vía cutánea (uso externo).

PELIGROS DE TOXICIDAD PARA LA ESPECIE EN QUE SE APLICA:

Entre las reacciones adversas muy raras que se han comunicado después de la utilización del producto se encuentran: reacciones cutáneas transitorias en el punto de aplicación (decoloración de la piel, pérdida de pelo local, picor, rojez), así como picor general o pérdida de pelo. Tras la administración del medicamento, también se ha podido observar salivación excesiva, signos nerviosos reversibles (sensibilización a la estimulación incrementada, depresión, otros signos nerviosos), vómitos o síntomas respiratorios.

En caso de lamido, puede observarse un breve periodo de salivación excesiva debido principalmente a la naturaleza del excipiente. Por lo tanto, administrar la dosis recomendada.

CONSERVACIÓN:

Mantenga en lugar seco y fresco, a temperatura no superior a 30°C.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

No se conocen.

PRESENTACIÓN:

Pipetas aplicadoras con la cantidad exacta de dosis según la cantidad de kilogramos de la mascota.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE:

INGESTIÓN: Si ha ingerido el producto y la persona está consciente provoque el vómito administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia). Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

INHALACIÓN: Remover a la víctima a donde haya aire fresco. Si no está respirando proceda a dar respiración, preferentemente de boca a boca. Llame inmediatamente al médico.

CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL: Lave con abundante agua. Consulte a su médico si la irritación persiste.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Efectuar tratamiento sintomático. No hay antídoto conocido.

GRUPO QUÍMICO: FENILPIRAZOLES.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede causar irritación en las mucosas (incluyendo ojos), se recomienda evitar el contacto con la boca y ojos.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: No existe antídoto. Trate al paciente sintomáticamente.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.

“Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.

“En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con un algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al

centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:

Este producto es **ALTAMENTE** tóxico para animales terrestres de sangre caliente (aves).

Este producto es **ALTAMENTE** tóxico para abejas. No lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentren libando.

DISTRIBUIDO POR:**PET AND PLAY, S.A. DE C.V.**

Av. Central 206, 2do. Piso. Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón. C.P. 01180. México, D.F.
Tel. (52) 55-5278-4680

HECHO EN MÉXICO

24.09.15 TR