



FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

USO VETERINARIO

“Consulte al médico veterinario antes de usar este producto”



TALCO ANTIPULGAS propoxur

Insecticida carbámico / Polvo
Ectoparasiticida (uso tópico) y de Rastreo
RSCO-URB-INAC-183-315-001-01

Registro uso pecuario en trámite

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo:	P/P
Propoxur: 2-(1-metiletoxi) fenil metil carbamato	No menos de...1.00% (Equivalente a 10 g de i.a. / kg)
Ingredientes inertes:	
Diluyente y adsorbente	No más de... 99.00%
TOTAL.....	100.00%

PUEDA SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

PRECAUCIÓN

**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR
EL PRODUCTO**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Se recomienda utilizar guantes al manejar el producto. Después de la manipulación de este producto se recomienda lavarse con agua y jabón.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.”

“No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.”

“Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.”

“Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.”

“Los menores de 18 años no deben manejar este producto.”

“No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos.”

INSTRUCCIONES DE USO

Pet *n Play (Proxur 1% PR) es un polvo insecticida listo para su uso y de fácil aplicación. Está especialmente recomendado para utilizarse como polvo seco en casas habitación y clínicas veterinarias, con acción prolongada, protege las áreas ocupadas por tu familia y tus mascotas por varios días después de aplicarlo.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO:

En Superficies (Polvo de Rastreo):

El talco **Pet *n Play** está listo para su uso, aplique el producto directamente en zonas que frecuenta su mascota como camas, tapetes, cojines, casas, sillones, bolsas transportadoras o áreas donde usted permita que éste permanezca.

Aplicación Tópica (Ectoparasitocida):

Espolvorear de 4 a 8 veces del talco **Pet *n Play** sobre el pelaje de su mascota, especialmente en el lomo y dorso y distribuya por frotamiento en todo el cuerpo. Generalmente basta con una aplicación.

En aves de corral procure espolvorear a fondo la región de debajo de las alas y de la cloaca.

Después de la aplicación, cierre bien la pulverizadora.

RECOMENDACIONES DE USO: Utilizar guantes de látex durante la aplicación del producto. No utilizar en aves de adorno y canoras. Utilícese en cachorros de un mes y medio de vida en adelante.

PLAGAS A ELIMINAR	DOSIS
Pulgas (<i>Ctenocephalides spp., Pulex irritans</i>)	
Piojos (<i>Trichodectes canis, Felicola subrostratus</i>)	10 – 20 g/m ² (Aproximadamente de 4 a 8 espolvoreadas)
Piojillo dorado (<i>Dermanyssus avium</i>)	

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Puede aplicarlo cada 30 días si es necesario o cada que haya una nueva infestación.

MANEJO DE RESISTENCIA: La resistencia de las pulgas a los carbamatos, incluido el **propoxur**, puede llegar a ser común. Una opción es rotar con algún piretroide.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique directamente en humanos.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA.”

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgalo abrigado. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental provoque el vómito dando a beber agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia) repita la operación hasta que el vómito sea claro. “Nunca dé a beber o induzca el vómito en una persona inconsciente”.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Carbamato.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En caso de ingestión; Leves: Dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito y diarrea. Agudos: Contracción de la pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa y calambres.



FICHA TÉCNICA

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTOS: En caso de adultos, suministrar dos comprimidos de 0.5mg de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe ser supervisado por un médico. En caso de síntomas severos, administrar 2 a 4 mg de sulfato de atropina por V.I. lentamente hasta completar atropinización. El 2-PAM u otras oxinas, no son útiles para reactivar la actividad de la colinesterasa, están contraindicadas.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“Durante el manejo del producto evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.

“Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.

“El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (Arenosos)”.

En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: Este producto es ALTAMENTE tóxico para aves como codorniz y estornino.

Distribuido en México por:

PET AND PLAY, S.A. DE C.V.

Av. Central 206, 2do. Piso. Col. San Pedro de los Pinos C.P. 01180. México, D.F.

Tel. (55) 52-78-46-80

HECHO EN MÉXICO

23.09.15 TR